

LDL-c 管理プロトコルシート

様式-2

冠動脈治療時

ストロングスタチン高用量の投与

退院時

LDL-c<70mg/dL

スタチン高用量継続

LDL-c $\geq$ 70mg/dL

エゼチミブ10mg追加

退院時～1か月外来時

LDL-c<70mg/dL

治療継続

LDL-c $\geq$ 70mg/dL

PCSK9阻害薬導入に関して
急性期病院ご紹介ください

FH: 家族性高コレステロール血症 以下のうち2つで診断

①未治療時LDL-c>180 mg/dL

②腱黄色腫または皮膚結節性黄色腫

アキレス腱肥厚X線：男性 8.0 mm, 女性 7.5 mm

③第一近親にFHまたは男性<55、女性<65歳の冠動脈疾患

薬剤名	高用量	最大量
ロスバスタチン	10 mg	20 mg
アトルバスタチン	20 mg	40 mg (FHの方)
ピタバスタチン	4 mg	4 mg

～患者さんへ～

LDLコレステロールは血糖値や血圧に比べて一般的な認知度は低いものの、冠動脈疾患の再発予防においては治療効果の高い介入ポイントです。是非ご自身の血液検査値が目標値に達しているか毎回確認してみましょう。

*FH、糖尿病、末梢動脈疾患合併、複数イベント既往、若年などより厳格（LDL-c<55 mg/dL）な目標設定も考慮。